

口腔助理医师考试：《答疑周刊》2021 年第 50 期

【口腔修复学】

Kennedy 第一类缺失中混合支持式义齿的具体措施不正确的是

- A. 用大连接体或基托连接
- B. 取功能性印模或压力印模
- C. 减小间接固位体和扩大鞍基
- D. 减小人工牙颊、舌径、近远中径
- E. 主要基牙上设计固位、支持、稳定作用良好的卡环

【正确答案】 C

【答案解析】 混合支持式义齿：此种设计适宜于双侧后牙部分或全部缺失、余留牙健康的情况下。

具体措施

- a. 在主要基牙上设计固位、支持、稳定作用良好的卡环；
- b. 增加间接固位体和扩大鞍基，使（牙合）力分散到多个天然牙及更广泛的牙槽嵴上；
- c. 取功能性印模或压力印模，以补偿鞍基下沉；
- d. 减小人工牙颊、舌径、近远中径，或减少人工牙数目，以减小（牙合）力，相应减小基牙和牙槽嵴的负荷；
- e. 采用应力中断式卡环或设计近中（牙合）支托，以缓冲主要基牙上的扭力；
- f. 用大连接体或基托连接，以达到平衡和传递、分散（牙合）力的作用。

【口腔修复学】

以下关于可摘局部义齿基托的表述中，正确的是

- A. 基托可进入基牙邻面倒凹区
- B. 前部基托边缘不应位于舌隆突上
- C. 基托应与牙面密合，对牙齿有一定的压力
- D. 基托近龈缘处要做缓冲
- E. 基托应与牙面轻微离开，不对牙齿形成任何压力

【正确答案】 D

【答案解析】 可摘局部义齿覆盖龈缘区的组织面要缓冲，以免压迫牙龈组织。基托应与余留天然牙邻面和舌面的非倒凹区之间密合而无间隙，基托不应进入基牙邻面和余留牙舌面的倒凹区，以免造成义齿摘戴困难。前牙区腭（舌）侧基托边缘应远离前牙舌侧龈缘，或者位于舌隆突上，并与之密合。

【卫生法规】

《麻醉药品和精神药品管理条例》中规定，医疗机构使用麻醉药品，第一类精神药品的，首

先应该取得

- A. 麻醉药品、第一类精神药品供货商
- B. 麻醉药品、第一类精神药品相关原材料
- C. 麻醉药品、第一类精神药品使用权
- D. 麻醉药品、第一类精神药品生产权
- E. 麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡

【正确答案】 E

【答案解析】 《麻醉药品和精神药品管理条例》规定，医疗机构需要使用麻醉药品和第一类精神药品的，应当经所在地设区的市级人民政府卫生主管部门批准，取得麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡（简称印鉴卡）。

【卫生法规】

以下关于药物不良反应的描述中，正确是

- A. 药物不良反应是指在正常用量、用法下发生的
- B. 药物不良反应就是药物本身的毒副作用
- C. 药物的不良反应专指药物本身的“三致”作用
- D. 大剂量服用催眠药而致中毒也是药物不良反应
- E. 将氯化钾快速静脉注射而致死亡是药物不良反应

【正确答案】 A

【答案解析】 不良反应：为了预防、诊断、治疗疾病或改变人体的生理功能，在正常用法、用量下服用药物后机体所出现的非期望的有害反应。