

医学教育网临床助理医师考试:《答疑周刊》2022年第6期

消化系统在医师考试中属于分数多、拿分较容易的科目,这里介绍胃癌相关的考点。

问题索引:

1. 胃癌检查的特征是什么?
2. 胃癌最常见的治疗方法是什么?
3. 胃癌的转移途径有哪些?

具体解答:

1. 胃癌检查的特征是什么?

男性,45岁,上腹隐痛,便潜血阳性,钡餐见胃窦小弯侧黏膜纹理紊乱,胃壁僵直。首先考虑

- A. 慢性胃炎
- B. 胃溃疡
- C. 胃癌
- D. 胃淋巴瘤
- E. 萎缩性胃炎

【答案】C

【解析】(胃癌)X线钡餐检查:应用气钡双重对比法、压迫法和低张造影技术,可更清楚的显示病灶,提高诊断准确率。胃癌主要表现为充盈缺损(息肉样或隆起性病变)、边缘欠规则或腔内龛影(溃疡)和胃壁僵直失去蠕动(癌浸润)等。对部分充盈缺损型病变,需与良性息肉鉴别;对恶性特征欠明显的溃疡,需与良性溃疡鉴别,这在很大程度上依赖组织病理学检查。[医学教育网原创]

2. 胃癌最常见的治疗方法是什么?

胃癌的治疗方法哪项正确

- A. 早期化疗

- B. 扪到肿块者做全胃切除
- C. 化疗+放疗
- D. 早期胃癌作胃癌根治术
- E. 早期胃癌作胃大部切除术

【答案】D

【解析】早期胃癌时行胃癌根治术，包括：①原发病灶所在器官的部分或全切除，切端须保证阴性；②彻底清扫可能被肿瘤所累及之区域性及有关远处淋巴结。胃大部切除术仅仅是单纯切除了局部病灶，一般用于消化性溃疡的外科治疗。[医学教育网原创]

3. 胃癌的转移途径有哪些？

男，58岁。上腹胀、隐痛2个月，伴食欲减退、乏力、消瘦、大便发黑。查体：消瘦，浅表淋巴结无肿大。上消化道钡剂造影见胃窦部小弯侧黏膜紊乱，可见直径4.5cm不规则充盈缺损，胃壁僵直。其最常见的转移途径是

- A. 血行转移
- B. 淋巴转移
- C. 直接浸润
- D. 胃肠道内转移
- E. 腹腔内种植

【答案】B

【解析】胃癌的转移可以有4条途径，通常以淋巴转移和直接蔓延为主，在晚期也可经血行转移。此外，癌细胞可以直接种植于腹腔内。淋巴转移：是胃癌扩散的重要途径，而且发生较早。[医学教育网原创]