

医学教育网儿科主治医师：《答疑周刊》2024年第5期

儿童保健是每次主治考试中必考的知识点，尤其是疫苗接种，是作为儿科医生必须要掌握的内容，其中主要是记忆类的知识。

问题索引：

1. 各年龄期儿童的保健重点？
2. 疫苗接种的时间？
3. 疫苗接种的反应和注意事项？

具体解答：

1. 各年龄期儿童的保健重点？

各年龄期儿童的保健重点错误的是

- A. 预防遗传性疾病与先天畸形是胎儿期的保健任务
- B. 婴儿期重点是合理喂养，尤其强调母乳喂养
- C. 幼儿期、学龄前期都应注意预防意外事故
- D. 学龄期培养想象与思维能力
- E. 青春期应进行正确的性教育

【答案】D

【解析】胎儿期保健的主要任务是：预防遗传性疾病与先天畸形、保证充足营养、给予孕母良好的生活环境、预防产时感染、预防并及时处理围生期新生儿疾病。婴儿期保健重点是合理喂养，尤其强[医学教育网原创]调母乳喂养，4~6个月应开始添加辅食，定期进行体格检查，坚持户外活动，用带有声、光、色的玩具促进其感知发育和按计划免疫程序完成基础免疫。幼儿期、学龄前期都有一定活动能力，且无安全意识，都应注意预防意外事故。培养想象与思维能力是学龄前期的保健要点。青春期应进行正确的性教育。

2. 疫苗接种的时间？

新生儿期应进行的预防接种为

- A. 卡介苗

- B. 卡介苗、乙肝疫苗
- C. 卡介苗、脊髓灰质炎疫苗
- D. 乙肝疫苗
- E. 乙肝疫苗、乙肝高效价免疫球蛋白

【答案】 B

【解析】新生儿是指出生后二十八天内的婴儿,在这段时间里两种疫苗可以接种,乙肝疫苗、卡介苗。

3. 疫苗接种的反应和注意事项?

关于疫苗接种反应和注意事项,描述错误的是

- A. 出生时未接种,2个月小儿无论结核菌素试验结果,都应补种
- B. 接种脊髓灰质炎疫苗可有低热
- C. 接种麻疹疫苗前1个月及接种后2周应避免使用胎盘球蛋白
- D. 接种百白破疫苗局部可有疼痛
- E. 乙肝疫苗接种后可出现局部红肿

【答案】 A

【解析】2个月以上儿童接种卡介苗前应做结核分枝杆菌试验(1:2000),阴性才能接种,接种后4~6周局部有小溃疡。脊髓灰质炎疫苗接种后一般无特殊反应,有时可有低热或轻泻。部分儿童接种麻疹疫苗后9~12天,有发热及卡他症状,一般持续2~3天,也有个别儿童出现散在皮疹或麻疹黏膜斑,接种前1个月及接种后2周避免用胎盘球蛋白、丙种球蛋白制剂。接种百白破疫苗一般无反应,个别有轻度发热,局部红肿、疼痛、发痒。处理:多饮开水,有硬块时可逐渐吸收。接种乙肝疫苗一般无反应,个别有局部轻度红肿、疼痛,很快消退。