

内科主治医师考试：《答疑周刊》2019 年第 33 期

问题索引：

一、【问题】阿尔茨海默病痴呆阶段的临床表现有哪些？

二、【问题】面神经炎临床表现有哪些？

三、【问题】三叉神经痛的临床表现有哪些？

具体解答：

一、【问题】阿尔茨海默病痴呆阶段的临床表现有哪些？

痴呆阶段 认知损害导致了日常生活能力下降。

(1) 轻度：主要表现记忆障碍。近记忆减退是首发症状。不能精确地临摹立体图。语言基本正常，但可出现命名障碍。人格和社会活动保持正常。

(2) 中度：记忆力障碍继续加重，工作、学习新知识和社会接触能力减退。视空间功能障碍，出现迷路、穿衣困难和摔东西。认知方面出现计算和推理障碍，有失认和失用。出现失语。情感淡漠。工作能力下降。查体发现锥体系和锥体外系体征。EEG 出现慢节律，CT 检查正常或脑萎缩。

(3) 重度：智能严重衰退，呈现完全性缄默，四肢僵直及锥体束征，二便失禁。对任何事都失去兴趣，出现震颤麻痹、消瘦和（或）惊厥发作。最后死于继发感染。

二、【问题】面神经炎临床表现有哪些？

1. 任何年龄均可发病，男性多于女性。

2. 急性起病，面神经麻痹数小时至数天达高峰，最显著症状是面部表情肌瘫痪，额纹消失，眼睑不能闭合或闭合不全、不能皱眉、鼓腮漏气等。患者起病前 1~2 日有患侧耳后持续性疼痛和乳突部压痛，严重疼痛提示带状疱疹病毒感染，可先于疱疹出现并进展为膝状神经节综合征。

3. **查体** 鼓索以上面神经病变出现舌前 2/3 的味觉减退；镫骨肌神经以上部位受损则同时有舌前 2/3 的味觉减退以及听觉过敏；膝状神经节炎受累时，还可见乳突部疼痛，耳廓、外耳道感觉减退和外耳道、鼓膜疱疹，称为 Ramsay-Hunt 综合征。

三、【问题】三叉神经痛的临床表现有哪些？

病多发生于中老年，女性略多于男性。常局限于三叉神经 1 或 2 支分布区内。突

发的短暂剧痛为特征，如刀割、针刺、撕裂、烧灼或电击样剧烈难忍，每次发作时间仅数秒钟至 2 分钟，突发突止，间歇期完全正常。口角、鼻翼、面颊、上下唇、门齿、齿龈、舌等处最为敏感，稍加触动即可诱发疼痛，故有“扳机点”之称。严重者洗面、进食、刷牙、剃须、打呵欠均可引起发作，以致不能做这些动作。疼痛常反射性地引起罹患侧面肌的抽搐，口角牵向患侧，称痛性抽搐。病初次数较少，以后多增加并加重。病程可呈周期性。每次发作期可数天到数月不等。神经系统检查无异常所见。病人精神萎靡不振，行动谨小慎微，甚至不敢洗脸、刷牙、进食，表情呈精神紧张、焦虑状态。



内科主治医师考试：《答疑周刊》2019 年第 33 期（word 版下载）

〔医学教育网版权所有，转载务必注明出处，违者将追究法律责任〕

