

2019年公卫执业助理医师:《答疑周刊》第22期

【临床综合】

女, 38岁, 3个月前患乙型病毒性肝炎, 近1周发热, 全身皮肤及粘膜出血, 血红蛋白 58g/L, 红细胞 $2.3 \times 10^{12}/L$, 白细胞 $0.5 \times 10^9/L$, 血小板 $22 \times 10^9/L$ 。分类: 中性 0.2, 淋巴 0.78, 单核 0.02, 网织红细胞 0.002, 骨髓涂片: 红系、粒系、巨核系均显著减少, 淋巴 0.74%。最可能的诊断是

- A. 急性白血病
- B. 粒细胞缺乏
- C. 脾功能亢进
- D. 再生障碍性贫血
- E. 特发性血小板减少性紫癜

【答案】D

【答案解析】再生障碍性贫血简称再障, 是一组由多种病因所致的骨髓功能障碍, 以全血细胞减少为主要表现的综合征。

【临床综合】

某脑血栓形成患者, 起病24小时, 有右侧偏瘫、昏迷。查: 血压 21.3 / 12kPa (160 / 90mmHg), 脑脊液压力 2746Pa (280mmH₂O), 细胞数 $12 \times 10^6 / L$ 。治疗应首先选用

- A. 静脉滴注青霉素
- B. 静脉滴注能量合剂
- C. 肌肉注射利血平
- D. 静脉滴注甘露醇
- E. 静脉滴注肝素

【答案】D

【答案解析】脑脊液压力 2746Pa (280mmH₂O), 说明其颅内压较高, 甘露醇是颅内压升高的首选药物。

【流行病学】

一个队列研究得到了下列率: 全体男医生肺癌的发病率为 0.94%, 所有吸烟男医生的发病率为 1.30%, 非吸烟男医生的发病率为 0.07%, 据此资料 RR 值为

- A. 0.94
- B. 1.30
- C. 0.07
- D. 18.57
- E. 0.87

【答案】D

【答案解析】相对危险度 (RR) 是暴露组与对照组的危险度之比。 $RR = I_e / I_o = 1.30\% / 0.07\% = 18.57$ 。

【流行病学】

一个队列研究得到了下列率: 全体男医生肺癌的发病率为 0.94%, 所有吸烟男医生的发病率为 1.30%, 非吸烟男医生的发病率为 0.07%, 其 AR 值为

- A. 0.36%
- B. 0.87%
- C. 1.23%

D. 0.29‰

E. 1.30‰

【答案】C

【答案解析】归因危险度(AR)是暴露组发病率与对照组发病率的差值,表示危险特异地归因于暴露因素的程度。 $AR=I_e-I_o=1.30‰-0.07‰=1.23‰$ 。

