

医学教育网初级护师考试：《答疑周刊》2021 年第 2 期

1. 【问题】外伤性的脑内血肿跟小脑幕切迹疝的关系？

【解答】颅内血肿，根据血肿形成的部位会出现不同的脑疝，即包括枕骨大孔疝和小脑幕切迹疝。枕骨大孔疝会因脑干缺氧，瞳孔可忽大忽小；小脑幕切迹疝时，会出现一侧瞳孔先缩小继之进行性散大，并且对光反射减弱或消失。

2. 【问题】慢性胃炎常见症状和典型症状？

【解答】慢性胃炎病程迁延，多无明显症状。部分病人有消化不良的表现，多数为上腹部隐痛或不适、反酸、上腹部饱胀、嗝气、食欲不振、恶心、呕吐等，少数病人有呕血与黑便。本病多无明显体征，有的病人可有上腹部轻压痛。自身免疫性胃炎病人可有舌炎及贫血。

3. 【问题】患儿 6 岁，体重 20kg，烧伤面积 40%，问第一个 24 小时应补充晶体和胶体液量为好多？怎么算？

【解答】我国常用的烧伤补液量计算公式：伤后第一个 24 小时补液量按病人每千克体重每 1%烧伤面积（II～III度）补液 1.5ml（小儿 1.8ml，婴儿 2ml）计算，即第一个 24 小时补液量=体重（kg）×烧伤面积（%）×1.5ml，另加每日生理需水量 2000ml，即为补液总量。
患儿 6 岁，属于小儿，所以是：20×40×1.8ml=1440ml，该题只问了第一个 24 小时应补充晶体和胶体液量，所以不用加生理需水量，答案是 1440ml。

4. 【问题】不同的水温适用的情况？

【解答】鼻饲液温度 38～40℃左右

温水擦浴的温度是 32～34℃

乙醇擦浴的水温是 30℃

热水袋水温成人 60～70℃，昏迷、老人、婴幼儿、感觉迟钝、循环不良等病人，水温应低于 50℃

热湿敷水温为 50～60℃

热水坐浴水温为 40～45℃

温水浸泡水温为 43～46℃

5. 【问题】新生儿败血症与溶血症的区别。

【解答】新生儿溶血症：因母、婴血型不合而引起的同族免疫性溶血，使胎儿在宫内或生后发生大量红血球破坏，出现一系列溶血性贫血、黄疸以及其它多种临床表现的疾病。

新生儿败血症：新生儿期细菌侵入血液循环，并在其中繁殖和产生毒素所造成的全身性感染，主要表现有呼吸窘迫，低血压、酸中毒等。

