

医学教育网护士资格：《答疑周刊》2022 年第 12 期

1. 【问题】角色行为缺如 角色行为强化 角色行为异常 角色行为冲突 角色行为消退 如何区别理解？

【解答】(1) 角色行为缺如：否认自己有病，未能进入角色。

(2) 角色行为冲突：病人角色与其他角色发生心理冲突。

(3) 角色行为减退：因其他角色冲击病人角色，从事了不应承担的活动。

(4) 角色行为强化：安于病人角色的现状，期望继续享有病人角色所获得的利益。

2. 【问题】不同瞳孔的改变以及相关疾病？

【解答】(1) 瞳孔缩小多见于有机磷、巴比妥类、吗啡等药物中毒病人。

(2) 瞳孔散大多见于视神经萎缩、阿托品药物中毒及深昏迷病人。

(3) 两侧瞳孔大小不等，提示颅内病变，如颅内出血、脑肿瘤及脑疝等。

3. 【问题】腹部各方位疼痛对应哪些疾病？

【解答】实质性脏器病变时腹痛多呈持续性疼痛，进行性加剧；

空腔脏器病变时呈阵发性绞痛。腹痛可表现为隐痛、钝痛、灼痛、胀痛、刀割样痛、绞痛等。

十二指肠、胃部疾患多为中上腹部隐痛、灼痛或不适，常伴有恶心、呕吐、嗝气、反酸、畏食等。

常见疼痛性疾病。

1. 阑尾炎早期，疼痛常发生在上腹部或脐周围。

2. 胆囊疾患胆囊炎、胆结石症等常在右肩体表发生疼痛等。

4. 胃溃疡和胰腺炎出现左上腹和肩胛间疼痛。

5. 肾结石可引起腹股沟区疼痛等。

4. 【问题】小儿腹泻中度低渗性缺水补液第一步首选的液体是 2:1 液吗？

【解答】所输液体的种类取决于脱水性质。低渗性脱水用 2/3 张含钠液；等渗性脱水用 1/2 张含钠液，高渗性脱水用 1/5~1/3 张含钠液。若临床判断脱水性质有困难时可先按等渗性

脱水处理。中度低渗性脱水应该用 4: 3: 2 液为 2/3 张。

5. 【问题】什么是护理诊断？

【解答】护理诊断是关于个人、家庭、社区对现存的或潜在的健康问题或生命过程反应的一种临床判断，是护士为达到预期结果选择护理措施的依据，这些预期结果是由护士负责的。

护理诊断是由名称、定义、诊断依据、相关因素四部分组成。

例如：低效性呼吸形态（P）：发绀、呼吸急促（S）：与胸部疼痛有关（E）。、

护理诊断按优先顺序分类

（1）首优问题：是直接威胁病人生命、需要立即行动去解决的问题，排在首位。如“心排出量不足”、“气体交换受损”等。

（2）中优问题：虽不直接威胁病人的生命，但也能导致身体上的不健康或情绪上变化的问题。如“体温过高”、“有感染的危险”等。

（3）次优问题：指与此次发病关系不大，在护理过程中可稍后解决的问题。如对于阻塞性肺气肿病人，伴有肥胖，存在的“营养失调：高于机体需要量”等。

6. 【问题】血清钠低于 135mmol/L。不是低渗性脱水吗？

【解答】不同性质脱水的临床表现

	低渗性	等渗性	高渗性
血钠（mmol/L）	<130	130~150	>150
口渴	不明显	明显	极明显
皮肤弹性	极差	稍差	尚可
血压	明显下降	下降	正常/稍低
神志	嗜睡/昏迷	萎靡	烦躁/惊厥