

医学教育网外科主治医师：《答疑周刊》2022 年第 23 期

问题索引：

1. 乳房后脓肿切开引流最好采用何种切口？
2. 溃疡性结肠炎病变多发于哪个位置？
3. 最多见的直肠肛管周围脓肿是什么？
4. 发生切口疝最主要的病因是什么？

具体解答：

1. 乳房后脓肿切开引流最好采用

- A. 乳房下缘弧形切口
- B. 乳房表面横切口
- C. 乳晕下缘弧形切口
- D. 乳房表面放射状切口
- E. 乳房外侧斜切口

【答案】A

【解析】乳房后脓肿切开引流最好采用乳房下缘弧形切口，以免损伤乳管。

[医学教育网原创]

2. 溃疡性结肠炎病变多位于

- A. 回肠末端及升结肠
- B. 直肠及乙状结肠
- C. 降结肠
- D. 全结肠
- E. 升结肠

【答案】B

【解析】直肠及乙状结肠为溃疡性结肠炎的好发部位。

[医学教育网原创]

3. 最多见的直肠肛管周围脓肿是

- A. 肛门周围脓肿
- B. 骨盆直肠窝脓肿

- C. 坐骨直肠窝脓肿
- D. 直肠后间隙脓肿
- E. 直肠黏膜下脓肿

【答案】A

【解析】 直肠肛管周围脓肿的感染灶多来自肛腺。最多见的是肛腺感染向下蔓延至肛门周围皮下形成脓肿。

[医学教育网原创]

4. 发生切口疝最主要的病因是

- A. 切口过长，缝合不够严密，对合差
- B. 引流物放置太久
- C. 切口发生感染
- D. 病人手术腹胀
- E. 腹部手术切口为纵行切口

【答案】C

【解析】切口疝是发生于手术切口的疝，多见于腹部纵形切口者。其中最主要的切口感染所致腹壁组织破坏，约占全部病例的 50%左右，其他如留置引流物过久、切口过长、缝合不严密、术后腹胀均可导致切口疝的发病。

[医学教育网原创]