

医学教育网外科主治医师:《答疑周刊》2022年第31期

血栓闭塞性脉管炎是每年都会出现的考点,今天我们带大家回忆一下其相关知识点。

问题索引:

1. 血栓闭塞性脉管炎最突出的症状是什么?
2. 肢体抬高试验如何判断是否为阳性?
3. 判断大隐静脉曲张能否手术治疗的关键检查是什么?

具体解答:

1. 血栓闭塞性脉管炎最突出的症状

- A. 患肢疼痛
- B. 患肢皮肤色泽变白
- C. 游走性浅静脉炎
- D. 间歇性跛行
- E. 患肢动脉搏动减弱

【答案】A

【解析】血栓闭塞性脉管炎最突出的症状为患肢疼痛,开始是由于动脉痉挛引起,晚期因动脉内膜发炎和血栓形成而闭塞,形成缺血性疼痛。

[医学教育网原创]

2. 体位性色泽改变试验(Buerger 试验)阳性是指

- A. 下肢先抬高 30° 后下垂, 肤色由白变轻度潮红
- B. 下肢先抬高 30° 后下垂, 肤色由黄变红
- C. 下肢先抬高 45° 后下垂, 肤色由白变红
- D. 下肢先抬高 45° 后下垂, 肤色由红变黄
- E. 下肢先抬高 60° 后下垂, 肤色由黄变白

【答案】C

【解析】肢体抬高试验(Buerger 试验、体位性色泽改变试验): 下肢先抬高 45° 后下垂, 肤色由白变红, 为试验阳性, 提示患肢有严重供血不足。

[医学教育网原创]

3. 判断大隐静脉曲张能否手术治疗的关键检查是

- A. Pratt 试验
- B. Trendelenburg 试验
- C. Perthes 试验
- D. Buerger 试验
- E. Eaton 试验

【答案】 C

【解析】 判断大隐静脉曲张患者能否手术治疗的关键是看其深静脉是否通畅，Perthes 试验又称深静脉通畅试验，是用以检查深静脉是否通畅试验。

[医学教育网原创]