

医学教育网护士执业资格：《答疑周刊》2022年第52期

问题索引：

1. 【问题】阑尾周围脓肿、化脓性阑尾炎、穿孔性怎么鉴别？
2. 【问题】肝硬化腹水处理原则。
3. 【问题】子宫内膜炎，子宫肌炎和股白肿怎么鉴别？
4. 【问题】腺病毒肺炎和金葡萄肺炎如何鉴别？

具体解答：

1. 【问题】阑尾周围脓肿、化脓性阑尾炎、穿孔性怎么鉴别？

【解答】

	病理改变	临床表现
急性单纯性阑尾炎	炎症只限于粘膜及粘膜下层	较轻
急性化脓性阑尾炎	病变扩展到阑尾壁各层并有小脓肿形成	可形成局限性腹膜炎
坏疽性及穿孔性阑尾炎	阑尾壁血液循环障碍坏疽、穿孔	弥漫性腹膜炎
阑尾周围脓肿	坏疽或穿孔，被大网膜包裹并形成粘连	炎性肿块或阑尾周围脓肿局限

2. 【问题】肝硬化腹水处理原则。

【解答】腹水的治疗

(1) 限制钠、水的摄入。

(2) 增加钠、水的排泄：利尿治疗以每天体重减轻不超过 0.5kg 为宜，利尿剂使用不宜过猛，避免诱发肝性脑病、肝肾综合征等。导泻：利尿剂治疗无效可应用导泻药。

腹腔穿刺放腹水：为减轻症状可行穿刺放腹水，但会丢失蛋白质，且短期内腹水又复原，应同时给白蛋白静脉点滴，可提高疗效。

(3) 提高血浆胶体渗透压：每周输注新鲜血、白蛋白、血浆，对改善一般

情况、恢复肝功能和消退腹水均有帮助。

(4) 腹水浓缩回输：放出腹水，通过浓缩处理后再静脉回输，可消除水、钠潴留，提高血浆白蛋白浓度及有效循环血容量，并能改善肾血液循环，对顽固性腹水是一种较好的治疗方法。

3. 【问题】子宫内膜炎，子宫肌炎和股白肿怎么鉴别？

【解答】子宫内膜炎：表现为子宫内膜充血、坏死，阴道内有大量脓性分泌物，而且有臭味。

子宫肌炎：表现为腹痛，恶露量多，呈脓性，子宫压痛明显，子宫复旧不良，可以伴有高热、寒战、头痛、心率增快、白细胞增多等全身感染的症状。

股白肿（血栓性静脉炎）：病变多在股静脉、腘静脉及大隐静脉处，当髂总静脉或股静脉栓塞时影响下肢静脉回流，出现下肢水肿、皮肤发白和疼痛（称股白肿）。

4. 【问题】腺病毒肺炎和金葡萄肺炎如何鉴别？

【解答】

(1) 腺病毒肺炎：以腺病毒为主要病原体。

1) 本病多见于6个月~2岁幼儿。

2) 起病急骤、全身中毒症状明显。体温达39℃以上，呈稽留热或弛张热，重症可持续2~3周。咳嗽频繁，可出现喘憋、呼吸困难、发绀。

3) 肺部体征出现较晚，多在发热4~5日后开始出现肺部湿啰音，以后因肺部病变融合而出现肺实变体征。

4) 胸片改变出现较肺部体征为早，特点为大小不等的片状阴影或融合成大病灶，肺气肿多见，病灶吸收需数周至数月。

(2) 金黄色葡萄球菌肺炎：

1) 多见于新生儿及婴幼儿。

2) 起病急、病情重、发展快。多呈弛张热，婴幼儿可呈稽留热。中毒症状明显，面色苍白，咳嗽，呻吟，呼吸困难。

3) 肺部体征出现早，双肺可闻及中、细湿啰音，易并发脓胸、脓气胸。常

合并循环、神经及消化系统功能障碍。



正保医学教育网
www.med66.com