

问题索引：

1. 下列病证中不宜使用下法治疗的是
2. 从五脏所主的色、味、脉来诊断该脏病。面色赤，口味苦，脉象洪可以诊断为哪个脏
3. “以热治寒，而寒拒热，则反佐以寒药而入之”体现的治法为
4. 长期微热，烦劳则甚，兼见有少气自汗、倦怠乏力等症表现的发热属于
5. 意识障碍伴呼吸缓慢的疾病是

1. 下列病证中不宜使用下法治疗的是

- A. 宿食
- B. 结痰
- C. 虫积
- D. 瘀血
- E. 痞块

【答案】E

【解析】痞块用消法。消法与下法均可[医学教育网]消除有形之邪，但两者作用不同。下法适用于燥屎内结、冷积不化、瘀血内停、宿食不消、结痰停饮以及虫积等证；消法适用于饮食停滞、气滞血瘀、癥瘕积聚、水湿内停、痰饮不化、痞积虫积以及疮疡痈肿等病证。下法是猛攻急下，消法是渐消缓散，方法不同，用药也各异。

2. 从五脏所主的色、味、脉来诊断该脏病。面色赤，口味苦，脉象洪可以诊断为哪个脏

- A. 肝
- B. 心

- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

【答案】 B

【解析】 从本脏所主的色、味、脉来[医学教育网]诊断本脏病。如面色赤，口味苦，脉象洪，可以诊断为心火亢盛等。因此选择 B 选项。

3. “以热治寒，而寒拒热，则反佐以寒药而入之”体现的治法为

- A. 寒热并用
- B. 寒者热之
- C. 热者寒之
- D. 寒因寒用
- E. 热因热用

【答案】 A

【解析】 寒热错杂、阴阳格拒的复杂病证，又当采用寒热并用佐治之法治之，即张介宾“以热治寒，而寒拒热，则反佐[医学教育网]以寒药而入之；以寒治热，而热拒寒，则反佐以热药而入之”之谓也。

4. 长期微热，烦劳则甚，兼见有少气自汗、倦怠乏力等症表现的发热属于

- A. 气虚发热
- B. 血虚发热
- C. 阴虚发热
- D. 气郁发热
- E. 小儿夏季热

【答案】 A

【解析】气虚发热：长期微热，烦劳则甚，兼见有少气自汗、倦怠乏力等症。

气郁发热：每因情志不舒而时有[医学教育网]微热，兼胸闷、急躁易怒等症。

血虚发热：时有低热，兼面白、头晕、舌淡脉细等症。

阴虚发热：长期低热，兼颧红、五心烦热等症。

小儿夏季热：小儿在夏季气候炎热时长期发热不已，兼见烦躁、口渴、无汗、多尿等症，至秋凉时不治自愈，是由于小儿气阴不足，不能适应夏令炎热气候所致。故本题选 A。

5. 意识障碍伴呼吸缓慢的疾病是

- A. 尿毒症
- B. 脑型疟疾
- C. 代谢性酸中毒
- D. 肝昏迷
- E. 吗啡中毒

【答案】 E

【解析】 意识障碍的伴随症状：

(1) 伴发热：先发热后出现意识障碍见于严重感染性疾病；先出现意识障碍后出现发热见于脑出血、脑肿[医学教育网]瘤、脑外伤等。

(2) 伴呼吸缓慢：见于吗啡或巴比妥类中毒、颅内高压等。

(3) 伴呼吸深大：见于尿毒症、糖尿病酮症酸中毒等。

(4) 伴瞳孔散大：见于酒精中毒、癫痫、低血糖昏迷等。

(5) 伴瞳孔缩小：见于海洛因、吗啡、巴比妥类、有机磷等中毒。

(6) 伴高血压：常见于脑出血、高血压脑病、肾炎等。

(7) 伴脑膜刺激征：见于各种脑膜炎及蛛网膜下腔出血等。