

医学教育网临床执业医师: 《答疑周刊》2023年第23期

消化系统中直肠肛管的主要生理功能就是排便。可因排便损伤和感染而发生皮肤裂开;也可因肛腺感染引起直肠肛管周围脓肿,这种脓肿可自行破溃到肛门旁形成肛痿。除了以上所说的直肠肛门疾病外,经常[医学教育网原创]碰到的就是大便带血,有人说十男九痔,确实患痔疮的人不少,但大便带血不都是痔疮,直肠息肉、直肠肿瘤甚至结肠肿瘤也会发生大便带血,今天主要给大家总结内痔及各种肛周脓肿的相关考试重点,具体如下:

**问题索引:**

1. 【问题】内痔如何分度?
2. 【问题】各种肛周脓肿的表现是什么?

**具体解答:**

1. 【问题】内痔如何分度?

**【解答】**

	出血	脱出
I度	便时带血、滴血或喷射状出血,便后出血自行停止	无[医学教育网原创]痔脱出
II度	常有	排便时有痔脱出,便后可自行还纳
III度	偶有	排便或久站,劳累、咳嗽、负重时痔脱出,需用手还纳
IV度	偶有	痔脱出不能还纳或还纳后又脱出

2. 【问题】各种肛周脓肿的表现是什么?

**【解答】**

	全身感染症状	局部症状
--	--------	------

肛门周围脓肿（最常见）	不明显	肛周持续、跳动性疼痛，排便、咳嗽及受压时加重。病变处明显红肿、压痛、硬结，有波[医学教育网原创]动感，可穿刺出脓液
坐骨肛管间隙脓肿	开始就有，如发热、寒战、食欲不振、恶心	由持续性胀痛而逐渐加重为明显跳痛，直肠指诊：压痛性包块、波动感。易形成肛瘘
骨盆直肠间隙脓肿	非常明显	不显著。CT 可发现脓腔
肛门括约肌间隙、直肠后间隙、高位肌间、直肠壁内脓肿	不同程度	不明显（位置深），表现为直肠、会阴坠胀感、排便时疼痛加重；直肠指检可触及痛性包块