

医学教育网外科主治医师:《答疑周刊》2023年第27期

急性硬膜外血肿是考试中常出现的考点,今天我们带大家回忆一下其相关知识点。

问题索引:

1. 急性硬膜外血肿的临床表现有什么?
2. 急性硬膜外血肿最易损伤哪个血管?
3. 急性硬膜外血肿中间清醒期长短取决于什么?

具体解答:

1. 急性硬膜外血肿的临床表现不正确的是

- A. 头疼、呕吐,躁动不安
- B. 两瞳孔缩小,光反射消失,眼球内斜
- C. 进行性颅内压增高及意识障碍
- D. 昏迷—清醒—再昏迷
- E. 偏瘫、失语和 Cushing 反应三主症

【答案】C

【解析】多有典型的昏迷清醒或好转—昏迷的意识演变过程。早期少有神经系统受累体征,至血肿形成后,出现脑受压和颅压高体征[医学教育网原创]如偏瘫、失语和 Cushing 三主征。可有伤侧颞部的头皮肿胀,再后出现脑疝的体征。进行性颅内压增高是急性硬脑膜下血肿的表现。

2. 急性硬膜外血肿最常见于下列血管损伤

- A. 脑膜中动脉
- B. 脑膜中静脉
- C. 静脉窦
- D. 板障静脉
- E. 脑膜前动脉

【答案】A

【解析】脑膜中动脉自棘孔进入颅内,走行于脑膜中动脉沟内,当骨折通过翼点

时, 容易损伤脑膜中动脉[医学教育网原创]致硬膜外血肿。

3. 急性硬膜外血肿患者中间清醒期的长短主要取决于

- A. 受伤方式
- B. 出血来源
- C. 血肿的部位
- D. 血肿形成的速度
- E. 血肿的大小

**【答案】**D

**【解析】**硬膜外血肿[医学教育网原创]中间清醒期的时间取决于原发脑损伤的程度和血肿形成的速度。

