

医学教育网主管护师:《答疑周刊》2023年第27期

问题索引:

1. 【问题】各种阴道炎的特征表现及治疗?
2. 【问题】革兰氏阴性杆菌感染的临床特点?
3. 【问题】子宫脱垂的分级?

具体解答:

1. 【问题】各种阴道炎的特征表现及治疗?

【解答】

	滴虫性阴道炎	外阴阴道假丝酵母菌病 (VVC)	细菌性阴道病	萎缩性阴道炎
病原体	阴道毛滴虫	白假丝酵母菌	加德纳细菌、厌氧菌	--
诱因	阴道环境 PH ↑	PH ↓、妊娠、糖尿病, 广谱抗菌素	菌群失调	PH ↑
传播方式	性交 (性传播疾病)	内源性传染	浴池、厕所、衣服、器械等	--
症状	脓性泡沫状白带、外阴瘙痒	白带多且呈豆渣样、剧烈的外阴瘙痒	臭味或鱼腥味、轻度瘙痒	稀薄淡黄色或血性白带
体征	阴道充血、点状出血、泡沫状物	阴道充血糜烂、阴道黏膜上附着白色膜样物	阴道黏膜正常	阴道黏膜充血; 常有小出血点
化验	悬滴法查见滴虫	悬滴法找芽孢及假丝酵母菌	清洁度改变, 线索细胞+	大量白细胞及基底层细胞, 无滴虫及念珠菌
治疗	甲硝唑	抗真菌药、碱性药	抗菌素、改善环境	1%乳酸或0.1%~0.5%醋酸液, 甲硝唑

是否夫妻同治	是	对有症状的性伴侣应同时进行治疗，无症状者无需治疗	否	否
--------	---	--------------------------	---	---

2. 【问题】革兰氏阴性杆菌感染的临床特点？

【解答】革兰氏阴性杆菌所致的脓毒血症常较严重。多见肠道、胆道、泌尿道感染和大面积烧伤时。此类细菌的内毒素及其介导的多种炎症介质可引起毛细血管扩张、通透性增加和微循环淤滞，导致有效循环血量减少。临床特点为全身寒战或间歇发热、四肢湿冷和“三低”现象（体温不升、低血白细胞计数、低血压），早期即可发生感染性休克，且持续时间长。引起菌血症的不单单是革兰阴性菌感染，还包括革兰染色阳性球菌感染等。

3. 【问题】子宫脱垂的分级？

【解答】I度：子宫颈下垂距处女膜 $<4\text{cm}$ ，但未脱出阴道口外。

轻型：子宫颈外口距处女膜缘 $<4\text{cm}$ ，未达处女膜缘。

重型：子宫颈已达处女膜缘，阴道口可见子宫颈。

II度：子宫颈及部分子宫体已脱出阴道口外。

轻型：子宫颈脱出阴道口，子宫体仍在阴道内。

重型：部分子宫体脱出阴道口。

III度：子宫颈及子宫体全部脱出阴道口外。