

医学教育网主管护师:《答疑周刊》2024年第3期

问题索引:

1. 【问题】肾结石与输尿管结石的区别?
2. 【问题】肾源性水肿组织疏松部位是眼睑和颜面部吗?
3. 【问题】为什么主动脉瓣关闭不全,舒张期血压是降低的?

具体解答:

1. 【问题】肾结石与输尿管结石的区别?

【解答】输尿管结石和肾结石的症状基本相似。结石的大小与梗阻、血尿和疼痛程度不一定成正比。输尿管结石的话,那么说明石头的位置比较低,如果说是肾结石的话,位置就比较高。

肾结石:肾区疼痛、伴肋脊角叩击痛,血尿。

输尿管结石:肾绞痛、阵发性腰部疼痛可放射至同侧腹股沟,还可累及同侧睾丸或阴唇。血尿,恶心呕吐,结石伴感染时可有膀胱刺激征。

2. 【问题】肾源性水肿组织疏松部位是眼睑和颜面部吗?

【解答】肾性水肿,通常以指凹性为主,也就是常说的一按一个坑。通常一开始出现在眼睑,然后是双下肢,最后是全身性水肿。[医学教育网]

心源性水肿的特点为:水肿先从身体的下垂部位开始,逐渐发展为全身性水肿。一般首先出现下肢可凹陷性水肿,以踝部最为明显。

3. 【问题】为什么主动脉瓣关闭不全,舒张期血压是降低的?

【解答】首先,心室舒张时,主动脉压下降,在心舒末期血压的最低值称为舒张压。正常情况下,左心室舒张时,主动脉瓣关闭,此时主动脉内残留的血液,维持向周围血管射血的压力;当主动脉瓣关闭不全时候,左心室舒张,血液有返流,主动脉内残留的血压比正常时候减少,向周围血管射血压力降低,即舒张压降低。