

医学教育网护士执业资格：《答疑周刊》2024年第10期

问题索引：

1. 【问题】库欣综合征最常见的原因？
2. 【问题】流产的类型？
3. 【问题】怎么区分 IgM、IgG、IgE 呢？

具体解答：

1. 【问题】库欣综合征最常见的原因？

【解答】垂体分泌促肾上腺皮质激素过多。

库欣病：垂体分泌促肾上腺皮质激素（ACTH）过多，[医学/教育网]导致双侧肾上腺增生，分泌大量的皮质醇，此类型最多见。

2. 【问题】流产的类型？

【解答】[医学·教育网]

类型	先兆流产	难免流产	不全流产	完全流产
流血	少	增多	多	少→无
腹痛	轻	加重	减轻	无
组织排除	无	无	常有（部分）	有（完全）
宫口	闭	扩张	扩张或组织堵塞	闭
子宫大小	与孕周相符	与孕周相符或略小	小于孕周	正常或略小于孕周
B超	胚胎存活	胚胎死亡	残留组织	正常宫腔
处理	卧床保胎	尽早刮宫	立即刮宫	不必处理

3. 【问题】怎么区分 IgM、IgG、IgE 呢？

【解答】IgM：IgM 也是初次体液免疫应答中最早出现的抗体，是机体抗感染的“先头部队”；血清中检出 IgM 提示新近发生感染，[医学·教育网]可用于感染的早期诊断。

IgG：是血清主要的抗体成分，是唯一可以通过胎盘的免疫球蛋白。

IgE: IgE 这种球蛋白, 可以促发、推进 I 型变态反应。因此检测血清中总 IgE 和特异性 IgE 的含量, 对于 I 型变态反应的诊断和过敏原的确定很有价值。

