

医学教育网外科主治医师：《答疑周刊》2024年第20期

乳腺炎是考试中常出现的考点，急性乳腺炎病因：乳汁淤积和细菌侵入。临床表现：早期局部疼痛、硬块、皮肤发热、发红，全身乏力、发热。中期上述症状加重，疼痛呈搏动性，患侧腋窝淋巴结肿大、寒战、高热、脉率加快、白细胞计数增高。后期局部脓肿形成，穿刺可抽出脓液，脓肿可自行破溃，亦可穿入乳管，自乳头排出脓液。有时可破入乳腺和胸大肌间的疏松组织中，形成乳腺后脓肿。脓肿形成后及时切开引流。注意：确定脓肿形成及位置；在乳腺腺体上选取轮辐方向放射状切开；乳腺多间隔脓肿尽量使其相互通畅，最好在脓腔最低处或另做切口对口引流。今天我们带大家看看这些考点如何出题。

问题索引：

1. 引起急性乳腺炎的病因最主要的是什么？
2. 急性乳腺炎的首发症状是什么？
3. 乳房后脓肿切口如何选择？

具体解答：

1. 引起急性乳腺炎最主要的原因是

- A. 初产妇
- B. 先天性乳头内陷
- C. 有乳腺囊性增生症病史
- D. 全身抵抗力下降
- E. 乳头皮肤破溃损伤

【正确答案】E

【答案解析】乳头破损或皲裂使[医学教育网原创]细菌沿淋巴管入侵是引起急性乳腺炎的最主要途径。

2. 急性乳腺炎的首发症状为

- A. 患侧腋窝淋巴结肿大
- B. 发热
- C. 搏动性疼痛

- D. 局部硬块
- E. 乳房肿胀疼痛

【正确答案】 E

【答案解析】 急性乳腺炎[医学教育网原创]常以乳房肿胀疼痛为首发症状。

### 3. 乳房后脓肿切开引流最好采用

- A. 乳房下缘弧形切口
- B. 乳房表面横切口
- C. 乳晕下缘弧形切口
- D. 乳房表面放射状切口
- E. 乳房外侧斜切口

【正确答案】 A

【答案解析】 乳房后脓肿切开引流最好采用[医学教育网原创]乳房下缘弧形切口，以免损伤乳管。